

DIPIROMAX

— Aves e Suínos —



**Dipirona sódica 60%
para aves e suínos**

Solução prática para redução do estresse térmico em frangos de corte e tratamento sintomático de estados febris e processos inflamatórios em suínos.

INDICAÇÕES



Frangos de corte:

redução do estresse térmico, contribuindo para a diminuição da temperatura corporal.



Suínos:

tratamento sintomático de estados febris e processos inflamatórios.



PERÍODO DE CARÊNCIA

- ✓ **Frangos de corte:** abate 8 dias após a última aplicação.
- ✓ **Ovos:** não administrar em aves reprodutoras de ovos para consumo humano.
- ✓ **Suínos:** abate 4 dias após a última aplicação.



ADMINISTRAÇÃO

Via oral, na água de bebida.



POSOLOGIA

Frangos de corte:

10 a 15 mg do princípio ativo/kg de peso vivo (equivalente a 16,66 a 25 mg do produto/kg de peso vivo).

Suínos:

1,2 a 15 mg do princípio ativo/kg de peso vivo (equivalente a 2 a 25 mg do produto/kg de peso vivo).



TEMPO DE TRATAMENTO

1 a 3 dias consecutivos.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES



Estável por 24 horas após diluído na água de bebida clorada ou não clorada.



Estável por 60 dias após abertura da embalagem primária.



Apresentação: sachês de 100 g, acondicionados em caixa de papelão de 5 kg.



VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.



USO VETERINÁRIO.

